

PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN PACIENTES QUE VAN A SER INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE

ETIQUETA CON LOS DATOS DEL PACIENTE

	PATOLOGÍA	ANTIBIÓTICO
	VIAS BILIARES (Colelitiasis, Coledocolitiasis, Ictericias obstructivas, Páncreas)	CEFMINOX (Tencef*): 2 grs. I.V. 1 hora antes de la intervención.
	PATOLOGIA GASTRICA (Neoplasias, Ulcus, etc.)	CEFMINOX (Tencef*): 2 grs. I.V. 1 hora antes de la intervención.
	HERNIAS Y EVENTRACIONES , con factores de riesgo: Edad > 60 años, diabetes, obesidad, hernias estranguladas, inmunosupresión.	AMOXICILINA + CLAVULÁMICO (Augmentine*): 2 grs. 1 hora antes de la intervención.
	APENDICITIS AGUDA	1ª Pauta: METRONIDAZOL (Flagyl*): 1500 mgrs. I.V. + GENTAMICINA 240 mgrs I.V. antes de la intervención, y: -Si es una apendicitis catarral o flemonosa, no purulenta, no poner más dosis. -Si es una apendicitis supurada con peritonitis localizada, seguir tres dias de tratamiento. -Si es una apendicitis perforada, seguir un mínimo de cinco dias de tratamiento. 2ª Pauta: AMOXICILINA + CLAVULAMICO (Augmentine*): 2 grs. I.V. antes de la intervención, y seguir o no con 2 grs I.V./8 horas, según pauta anterior.
	ALERGIA A PENICILINA	CIPROFLOXACINO (Baycip*): 400 mgrs. I.V. antes de la intervención y, si se precisa, continuar cada 12 horas.

NOTA: Señalar con una X en el recuadro de la izquierda, la patología a que se refiere la profilaxis antibiótica a administrar y la pauta en el caso de apendicitis aguda.

Fdo.- Dr. _____